

LAMOTRIGINE (拉莫三嗪)

LAMICTAL® (乐命达)

病人须知

此册为您解答一些对于此药物的疑问，并不完全详载此药之全部资料，若有任何疑问，可请教医生或药剂师。

此药有什么用途？

Lamotrigine 用于控制癫痫或惊风发作，也可用于神经系统的其他病例。

何时服用此药？

- 通常每日口服一至两次。刚开始服药时，医生会用较低的剂量，然后逐步地将剂量增加。请遵守标签上的指示，如有疑问请向药剂师或医生询问
- 在未经过医生的同意之前，请勿自行调整剂量或停止服药。突然停止服用此药会导致惊风症状不受控制。
- 若无医生同意，请勿擅自更换药物品牌或剂型。

如何服用此药？

Lamotrigine 可与食物一起服用，或空肚服用。

□ 药片

将药片与一杯开水一起吞服。

□ 溶解片

药片可咬碎，整粒吞服或将药片溶解服用。您也可把药片放入一匙的水内，让药片溶解后，再让您孩子服下。

忘记或漏服药该怎么办？

- 立即补服药物。若已接近下次服药的时间，不必补服而依照下次服药的时间服药
- 勿连服两剂 或自行增加剂量。
- 若孩子漏服两剂或以上的药物或您不清楚该怎么做，请向您的医生或药剂师询问。
- 若您孩子只剩两星期或更少的药量，请确保您已安排孩子下一次的复诊，或已得药单准备往药房购买药物。

此药会引起什么副作用？我该怎么应付这些副作用？

常见的副作用通常会在孩子开始服药期间出现。常见的副作用包括：

- 嗜睡、头痛、头晕、疲倦、失眠
若服用其他药物要特别小心， 伤风感冒药可能加重嗜睡的副作用。孩子进行骑自行车、游泳或其他类似活动时， 家长必须谨慎督促。
- 视线模糊， 双重视野， 眼球震颤
- 行为异常， 如焦虑、易怒
- 恶心， 呕吐， 肠胃不适， 腹泻或便秘， 食欲欠佳
若觉得肠胃不适， 药物可与食物一起服用， 但勿用汽水服药。
- 震颤、关节、颈部疼痛或手脚麻痹
- 痛经

若以上副作用在几天后仍没有消失， 或影响孩子的日常生活， 请告知医生。

此药可能导致一些罕见但严重的副作用。若出现以下副作用， 请立即通知医生或到急诊部求医：

- 严重皮疹， 皮肤发红， 发痒或脱皮
- 持续发烧， 喉咙疼痛， 口疮
- 皮肤或眼睛泛黄（黄疸）
- 不寻常的出血或淤血
- 肝脏肿大 - 腹部右上方， 肝脏部位呈现不寻常浮肿， 感觉压痛

若服用药后出现其他不寻常的现象， 请告知医生。若对于孩子服用药物有任何疑问或困难， 请与您的医生交谈或讨论。

其他资讯

在让孩子服用其他药物、补充品或草药前， 请告知医生或药剂师。

若孩子由于任何原因必须向其他医生求诊， 请告知他孩子在服用此药物。



Version 1

Last Review: 21/05/2018

Produced by Department of Pharmacy

KK Women's and Children's Hospital

PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®