

# 乐得美(Aldara™)乳膏

药物主要成份：Imiquimod 5% cream

## 用药指导单张

本单张将回答您一些有关乐得美(Aldara™)乳膏的常见问题。其内容不包含所有药物资讯。若有疑问，请咨询您的医生或药师。

## 乐得美乳膏的用途

乐得美乳膏的主要成份是 Imiquimod，用于治疗生殖器外部、肛门周围的疣和湿性尖锐湿疣 (genital warts) (俗称‘菜花’)。它可刺激免疫反应，使人体制造更多干扰素 (interferon) 来对抗病毒 (注：干扰素是人体自然产生的抗病毒物质)。虽然，目前仍未确定乐得美乳膏是透过何种方式消除疣，但一般相信是基于它对免疫系统所产生的影响。

## 什么时候使用？

- 除非医生特别指示，乐得美乳膏一般上每周涂抹三次 (可定在星期一、三、五或星期二、四、六)，于临睡前使用。
- 持续使用乐得美乳膏至疣完全消失。疣患一般在使用乳膏后八至十星期消失，也可能早在四星期便痊愈。
- 如疣复发，请告知医生。

## 如何使用乐得美乳膏？



临睡前，请将双手洗净。



然后拆开包装袋，将乐得美乳膏挤于手指头上。




将乳膏薄薄地涂抹在洁净而干爽的疣患表面，轻轻按摩至完全吸收。



完成后，请把剩余的乳膏连包装袋一并丢弃至儿童接触不到的地方。请以肥皂和清水洗双手。



抹上乳膏后六至十小时内，不可淋浴或浸浴。



六至十小时后，应以肥皂和清水清洗有用药的部位。

## 忘记使用乐得美该怎么办？

想起时，马上补抹并按日常使用时间继续疗程。如果已接近下一次使用时间，请勿补抹！只要按日常使用时间继续涂抹即可。在任何情况下，切勿因忘记用药而将份量加倍。

### **此乳膏会产生什么副作用？我该如何处理？**

在大部分情况下，以下所列的皮肤反应均属轻微至中度反应：发红（红斑）、片状、皮疹、皮下组织硬化、治愈时患处会结痂、皮肤很痒、灼热感、刺痛、患处或四周皮肤变白。此外，这些皮肤反应也可能是乳膏发挥功用的迹象。

若患处非常不舒服或皮肤反应过于严重，应以肥皂和清水洗去乳膏，并告知您的医生。

### **其他注意事项：**

使用过多的乳膏，可能引起严重的皮肤反应。

请以肥皂和清水把过多的乳膏洗去。

### **储藏方式：**

存放在阴凉（低于 25°C）、干燥，儿童接触不到的地方。



**SingHealth**

Version 1

Last Review: 01/08/2015

Produced by Department of Pharmacy

KK Women's and Children's Hospital

**PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®**