

PHENOBARBITONE

(本巴比特鲁)

病人须知

此册为您解答一些对于此药物的疑问，并不完全详载此药之全部资料，若有任何疑问，可请教医生或药剂师。

此药有什么用途？

Phenobarbitone 用于控制癫痫或惊风发作，也可用于神经系统的其他病例。

何时服用此药？

- 通常每日口服一或两次。刚开始服药时，医生会用较低的剂量，然后逐步地将剂量增加。请遵守标签上的指示，如有疑问请向药剂师或医生询问
- 在未经过医生的同意之前，请勿自行调整剂量或停止服药。突然停止服用此药会导致惊风症状不受控制。
- 若无医生同意，请勿擅自更换药物品牌或剂型。

如何服用此药？

□ 药水

服用前将药水摇匀。请用药房提供的茶匙或注射管喂药。勿用家用汤匙量药水，因为家用汤匙不能准确地量出剂量。

□ 药片

将整粒药片与一杯水一起吞服。若您孩子无法将整粒药片吞下，您可将药片压碎，并拌入少许食物（如：乳酸菌饮料，雪糕，糖浆），让孩童服下。

忘记或漏服药该怎么办？

- 立即补服药物。若已接近下次服药的时间，不必补服而依照下次服药的时间服药。
- 勿连服两剂或自行增加剂量。
- 若孩子漏服两剂或以上的药物或您不清楚该怎么做，请向您的医生或药剂师询问。

- 若您孩子只剩两星期或更少的药量，请确保您已安排孩子下一次的复诊，或已得药单准备往药房购买药物。

此药会引起什么副作用？我该怎么应付这些副作用？

常见的副作用通常会在开始服药期间出现。常见的副作用包括：

- 嗜睡、头晕或头痛
若服用其他药物要特别小心，伤风感冒药可能加重嗜睡的副作用。孩子进行骑自行车、游泳或其他类似活动时，家长必须谨慎督促。
- 性情转变；可能会兴奋、不安、情绪低落或有发噩梦的现象
- 恶心、呕吐、肠胃不适或便秘
若觉得肠胃不适，药物可与食物一起服用，但勿用汽水服药。
- 肌肉协调欠佳，失眠，幻觉

若以上副作用在几天后仍没有消失，或影响孩子的日常生活，请告知医生。

此药可能导致一些罕见但严重的副作用。若出现以下副作用，请立即通知医生或到急诊部求医：

- 皮肤或眼睛泛黄（黄疸）
- 严重皮疹、皮肤发红、发痒或脱皮
- 不寻常的出血或淤血，持续发烧、喉痛、口疮
- 呼吸困难

若服用药后出现其他不寻常的现象，请告知医生。若对于孩子服用药物有任何疑问或困难，请与您的医生交谈或讨论。

其他资讯

在让孩子服用其他药物、补充品或草药前，请告知医生或药剂师。

若孩子由于任何原因必须向其他医生求诊，请告知他孩子在服用此药物。



Version 1

Last Review: 01/08/2014

Produced by Department of Pharmacy

KK Women's and Children's Hospital

PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®