

VIGABATRIN (氨己烯酸)

SABRIL®

病人须知

此册为您解答一些对于此药物的疑问，并不完全详载此药之全部资料，若有任何疑问，可请教医生或药剂师。

此药有什么用途？

Vigabatrin（单独使用）用于控制 West's syndrome (infantile spasms)，与其他癫痫发作。

何时服用此药？

- 通常每日口服两次。刚开始服药时，医生会用较低的剂量，然后逐步地将剂量增加。请遵守标签上的指示，若有疑问，请向药剂师或医生询问。
- 在未经过医生的同意之前，请勿自行调整剂量或停止服药。突然停止服用此药会导致惊风症状不受控制。
- 若无医生同意，请勿擅自更换药物品牌或剂型。

如何服用此药？

将整粒药片与一杯开水吞服。若您孩子无法将整粒药片吞下，可将药片磨成粉，然后把药粉加入少许的食物里（比如；雪糕、乳酸菌饮料或糖浆）让孩子服用。此药可与食物一起服用或空肚服用。

忘记或漏服药该怎么办？

- 立即补服药物。若已接近下次服药的时间，不必补服而依照下次服药的时间服药。
- 勿连服两剂或自行增加剂量。
- 若孩子漏服两剂或以上的药物或您不清楚该怎么做，请向您的医生或药剂师询问。
- 若您孩子只剩两星期或更少的药量，请确保您已安排孩子下一次的复诊，或已得药单准备往药房购买药物。

此药会引起什么副作用？我该怎么应付这些副作用？

常见的副作用通常会在孩子开始服药期间出现。常见的副作用包括：

- 轻度嗜睡，头晕，头痛，思绪混乱，步伐异常，情绪紧张，失眠，精神难以集中
若服用其他药物要特别小心，伤风感冒药可能加重嗜睡的副作用。孩子进行骑轿车或其他类似活动时，家长必须谨慎督促。
- 行为异常如烦躁、焦虑
- 视觉受损：视野缺损，复视，色觉异常
- 腹痛，食欲与体重增加，便秘，腹泻，恶心，呕吐
- 皮疹
- 背或关节疼痛，肌肉乏力，手脚麻痹

若以上副作用在几天后仍没有消失，或影响孩子的日常生活，请告知医生。

此药可能导致一些罕见但严重的副作用。若出现以下副作用，请立即通知医生或到急诊部求医：

- 视力突然恶化
- 行为转变恶化

若服用药后出现其他不寻常的现象，请告知医生。若对于孩子服用药物有任何疑问或困难，请与您的医生交谈或讨论。

其他资讯

成年人服用此药后可能呈现视觉障碍，可是每 16 位服用此药的病童只有 1 位失去周边视野，而这也是在长期服用高剂量的后才会呈现此副作用。若您想对此副作用有更深的了解，请向您医生查询。

在让孩子服用其他药物、补充品或草药前，请告知医生或药剂师。

若孩子由于任何原因必须向其他医生求诊，请告知他孩子在服用此药物。

此药应储存于室温，免受阳光照射。



Version 1

Last Review: 01/08/2014

Produced by Department of Pharmacy

KK Women's and Children's Hospital

PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®