

Medication Information Leaflet
Administration Leaflet: Mixing Powdered Medication into Suspensions

调配粉状药水的程序

<p>1) 轻轻摇晃瓶子，让药粉松开，然后打开瓶盖。</p>	
<p>2) 如果瓶子有标示线显示终份量： a) 加入凉开水至标示线的一半高度。 b) 盖上瓶盖。 c) 摇晃瓶子一直到药水摇匀。 d) 让药水静置 2-5 分钟以去除瓶中的气泡。 e) 然后打开瓶盖。 f) 加入凉开水至标示线。</p>	 <p>2 - 5 minutes</p>
<p>或者</p> <p>2) 如果瓶子没有标示线： a) 使用包装里所附的量杯 / 针管，量出适量的凉开水，再将它加入药瓶中。</p>	
<p>3) 盖上瓶盖。倒置瓶子，然后大力摇晃瓶子至少 5 秒钟一直到药水摇匀。药水便可以服用了。</p>	
<p>4) 服药之前先把药水摇均匀。 5) 跟着指示以确保您服用正确的份量。</p>	

6) 已调配的药水有一定的保存期限。请查看瓶子上的标签，然后在保存期过后将剩余已调配的药水丢弃。

7) 如果有多过一瓶相同的药水，请先把已调配的药水服完后才调配下一瓶。



Last Review: 10/6/2021

Produced by Department of Pharmacy
KK Women's and Children's Hospital

PATIENTS. AT THE HE  RT OF ALL WE DO.®