MEDICATION TRANSLATION (ENGLISH/BENGALI)

PARACETAMOL/ANAREX TABLETS

Take __**tablets__times a day** when required for **fever, headache and bodyache**

জ্বর, মাথাব্যথাএবংশরীরেব্যথারজন্যপ্রয়োজনহলে__(tab) টিট্যাবলেটদিনে__(freq) বারখাবেন

SORE THROAT LOZENGES

Take __ **tablet to suck __ times a day** when required for **sore throat**

প্রয়োজনে, গলাব্যথারজন্যদিনে__(freq) বার__(tab) টালজেন্সমুখেরেখেচুষবেন।

SORE THROAT GARGLE

Gargle ___ **ml ___ times a day** when required for **sore throat**

গলায়ব্যথাহলে __ মিলি (ml) ঔষধেরসাথেদিনে__(freq) বারগরগরাকরবেন

SORE THROAT SPRAY

Place__ **sprays into throat __ times a day** when required for **sore throat**

গলায়ব্যথাহলে __ (dose) টিস্প্রেদিনে __(freq) বারমুখেরভেতরস্প্রেকরবেন।

FLU TABLET

Take__**tablet**__ **times a day** when required for **runny nose, itchiness or insomnia.** (This may cause drowsiness)

প্রয়োজনেচুলকানি, ঠান্ডাবাঅনিদ্রারজন্য_____(tab) টিট্যাবলেটদিনে__(freq) বারকরেখান(এইওষুধটিতেঘুমলাগতেপারে)

COUGH SYRUP

Drink__ml__times a day when required for cough

কাশিরজন্যদিনে_____(ml)মিলি__(freq) বারপানকরুন। শুধুপ্রয়োজনহলেখাবেন।

GASTRIC SYRUP

Drink __ml __times a day**when required** for gastric or stomach pain

গ্যাস্ট্রিকবাপেটেরব্যথারজন্য_____(ml)মিলি__(freq)বারপান করুন

ACETYLCYSTEINE TAB

Take __ tablet, dissolve in water and drink __times a day when required for phlegm

কফেরজন্যপ্রত্যাকবার __ (tab) টিট্যাবলেটপানিতেমিশানোরপরদিনে__ (freq) বারপানকরুন।শুধুপ্রয়োজনহলেখাবেন।

ANTIBIOTIC

Take __tablets __times a day after food. Complete the course to kill the bacteria.

দিনে __ (freq) বার __ (tab) টিকরেট্যাবলেটখাবেন, ভরাপেটে।

আপনারইনফেকশনএরচিকিৎসারজন্যপুরাকোর্সশেষকরবেন।

MDI SALBUTAMOL INHALER

Inhale __ puff __ times daily when necessary for shortness of breath or wheezing

শ্বাসকষ্টহলেশ্বাসকষ্টেরজন্যএইইনহেলারটি___ (puff)পাফকরেদিনে___ (freq)বারব্যবহারকরুন।

HYOSCINE STOMACH CRAMP TABLET

Take ___tablet ___times a day when required for stomach cramp (This may cause drowsiness)

পেটেরব্যথারজন্যদিনে___(freq) বার___(tab) টিকরেট্যাবলেটখাবেন।শুধুপ্রয়োজনহলেখাবেন।

DIARRHOEA TABLET (LOPERAMIDE/ LOMOTIL)

Take___tablet___times a day when required for diarrhoea

পাতলাপায়খানারজন্যদিনে___(tab) টিট্যাবলেট___(freq) বারকরেখান।শুধুপ্রয়োজনহলেওষুধটিখাবেন।

CHARCOAL TABLET

Take __ tablets ___ times daily when having diarrhoea, 2 hours apart from other medicines.

অন্যান্যওষুধথেকে২ঘন্টাবিরতিরেখেডায়রিয়ায়আক্রান্তহলে __(tab) টিকরেট্যাবলেটদিনে__(freq) বারসেবনকরবেন।

LACTULOSESYRUP

Drink _____ml _____times a daywhen required for constipation

কষারজন্যদিনে __ মিলি (ml) করে __ (freq) বারকরেপানকরুন। শুধুপ্রয়োজনহলেওষুধটিখাবেন।

CONSTIPATION TABLET

Take ___tablets ___ times a day when required for constipation

কষারজন্যদিনে__(freq) বার__(tab) টিকরেট্যাবলেটখান।শুধুপ্রয়োজনহলেখাবেন।

METOCLOPRAMIDE (NAUSEA/ VOMITING TABLET)

Take __ tablet ____ times a day when required for nausea or vomiting. Take on empty stomach 30minutes before food (may cause drowsiness)

বমিবাবমিরভাবেরজন্যপ্রয়োজনহলে ____(tab) ট্যাবলেটদিনে ____ (freq) খাবেন।খাবারেরআধাঘন্টাআগেখাবেন।এইওষুধখেলেঘুমআসতেপারে।

PROCHLORPERAZINE (GIDDINESS TABLET)

Take ___ tab ___ times a day when required for giddiness (may cause drowsiness)

মাথাঘোরানোএরজন্যপ্রয়োজনহলে ___ (tab) ট্যাবলেটদিনে ___ (freq) বারখাবেন।এইওষুধখেলেঘুমআসতেপারে।

NSAID TABLET (PAIN / SWELLING)

Take __ tablet __ times a day after food when required for swelling or pain

ব্যাথাবাফোলাএরজন্যপ্রয়োজনহলে ___(tab) ট্যাবলেটদিনে ___ (freq) বারখাবেন।ভরাপেটেওষুধটাখাবেন।

CREAM

Apply **thinly __times daily** over affected skin area

আক্রান্তচামরারউপরেপ্রতিদিননিয়মিত__বারপ্রয়োগকরুন

EYE DROP

__drop __ times daily into affected eye when required. Once opened, please discard 4 weeks from date of opening.

আক্রান্তচোখেপ্রতিদিন__(freq)বার____(drop)টিড্রপদিন।শুধুপ্রয়োজনহলেব্যবহারকরবেন।একবারখোলারপরে, খোলারতারিখথেকে 4 সপ্তাহরপরফেলেদিন।স

NASAL DROP

Use __drop__times daily into affected nostril for __ days when required.

___ (drop)ড্রপ/স্প্রে___(days) দিনেরজন্যআক্রান্তনাকেরনালায়প্রতিদিন___(freq)বারস্প্রে করুন।শুধুপ্রয়োজনহলেব্যবহারকরবেন।

NASAL SPRAY

Use __spray__times daily into both nostrils

___টি (spray)স্প্রেদুইনাকেরনালায়প্রতিদিন ___(freq) বারস্প্রেকরুন।

FAMOTIDINE TABLET

Take __ tablet __ times a day when required for gastric

এইওষুধটাগ্যাস্ট্রিকএরজন্য।প্রয়োজনহলে __ (tab)ট্যাবলেটদিনে __ (freq)বারখাবেন

OMEPRAZOLE CAPSULE

Take __ capsule __ times a day 30 minutes before meals when required for gastric

গ্যাস্ট্রিকএরজন্যপ্রয়োজনহলে __ (tab) ট্যাবলেটদিনে __ (freq) বারখাবেন।খাবারেরআধাঘন্টাআগেখাবেন।

METFORMIN TABLET

Take __ tablets __ times a day after food for blood sugar

ডায়াবেটিস বা সুগার এর জন্য ____ (tab) টি ট্যাবলেট দিনে _____(freq) বার ভরা পেতে খাবেন।

SULFONYLUREA TABLET

Take __ tablets __ times a day before food for blood sugar

ডায়াবেটিস বা সুগার এর জন্য ____ (tab) টি ট্যাবলেট দিনে _____(freq) বার খালি পেটে খাবারের আগে খাবেন

STATIN TABLET

Take __ tablets every night for cholesterol

কোলেস্টেরল এর জন্য প্রতি রাতে ___ (tab) টি ট্যাবলেট খাবেন।

BLOOD PRESSURE TABLET

Take __ tablets __ times a day for blood pressure

উচ্চ রক্তচাপের জন্য ____ (tab) টি ট্যাবলেট দিনে _____(freq) বার খাবেন।

CONTROLLER INHALER (ASTHMA)

Inhale __ puff __ times a day for asthma. Gargle with water after use.

হাঁপানি এর জন্য ইনহেলারব্যাবহার করবেন, __ (puff) টি পাফ/দম দিনে ___ (freq) বার মুখ দিয়ে টানবেন। দম টানার পর মুখে পানি দিয়ে গার্গল করবেন।

DRUG NAME:

Take __ tablets __ times a day

____ (tab) টিট্যাবলেটদিনে _____(freq) বারখাবেন।

These translations are done by well-minded volunteers. Please excuse any minor imperfections :)